


Agila

früh

NORIKA



Der zuverlässiger Alleskönner mit Bio-Eignung



erreicht schnell attraktive Grössen

Bio-geeignet

vielseitige Verwendbarkeit

schöne Waschoptik

Knolleneigenschaften

Kochtyp:	fest kochend
Reifezeit:	früh
Knollenform:	langoval
Fleischfarbe:	hellgelb
Schale:	gelb, glatt
Augen:	flach
Ertrag:	hoch

Resistenz gegen:

Nematoden:	Ro1 Ro4
Krebs:	keine

Neigung/ Anfälligkeit

Y-Virus:	gering
Blattrollvirus:	mittel
Rhizoctonia:	gering
Knollenfäule:	mittel
Krautfäule:	mittel
Schorf:	mittel
Rohverfärbung:	sehr gering

NORIKA

+49 38209 47 600
info@NORIKA.de
Parkweg 4 - 18190 Sanitz - Germany



Alle hier gemachten Anbauhinweise ergeben sich aus Erfahrung und Beobachtung, können aber, je nach Region und Standort von den gemachten Angaben abweichen. Deshalb möchten wir Ihnen empfehlen, beim Erstanbau Rücksprache mit unserem für Ihre Region verantwortlichen Mitarbeiter aufzunehmen.

Pflanzung

Standort: alle Böden

Pflanzgutvorbereitung:

eine Konditionierung/Vorbereitung des Pflanzguts wird empfohlen, Vorkeimung für eine frühe Ernte ist möglich

Beizung:

gegen Rhizoctonia empfohlen

Jugendentwicklung:

schnelle Jugendentwicklung

Pflanzabstand in cm bei Standardsortierung und 75 cm Reihenabstand

Anbauziel	leichter Boden	schwerer Boden	Pflanztiefe & Dammausbau
Speisekartoffeln	30 cm 44.000 Stk./ha	32 cm 41.000 Stk./ha	1-2 cm tiefer als ortsüblich mit sorgfältigem Dammaufbau

Düngung

bei 500 dt/ha Ertragsersparnis

Orientierungswert: Bei +/- je 10 t/ha möglicher Ertragsersparnis +/- 30 bis 40 kg N je ha; +/- 15 kg P₂O₅ je ha; +/- 60 K₂O je ha.

Anbauziel	Stickstoff (N)	Phosphor (P ₂ O ₅)	Kalium (K ₂ O)	Magnesium (MgO)	Bor (B)
Speisekartoffeln	100-120 kg/ha, inkl. Nmin insbesondere auf leichten und berechneten Standorten die N-Gabe splitten	100 kg/ha	250-300 kg/ha 2/3 vor dem Pflanzen (chloridisch), 1/3 nach Reihenschluss als chloridfreien Kalidünger	50 - 60 kg/ha	

Pflanzenschutz

Herbizideinsatz:

metribuzinhaltige Herbizide im VA möglich

Fungizideinsatz:

nach örtlichem Warndienst

Insektizideinsatz:

nach örtlichem Warndienst

Rodung

schonende Rodung; Knollentemperatur <10°C vermeiden; Schalenfestigkeit vor Rodung überprüfen

Lagerung

nach erfolgreicher Wundheilung sind die Knollen bei 5°C gut lagerfähig, sehr gute Keimruhe

Speiseconsumption
consommation
patata de consumo

Chips
crisps
chips
patatas fritas

Pommes frites
French fries
pommes frites
patatas fritas alargadas

Fertigprodukte
convenient products
produits transformés
productos semi-preparados

Trockenprodukte
dehydrated products
produits séchés
productos deshidratados

beste Schätleignung
best peeling quality
pour peler
por pela

sehr früh
first early
très hâtive
muy temprana

mittelspät
maincrop
demi-tardive
semi tardia

Kochtyp/ cooking type/ groupe culinaire

A fest kochend
firm cooking
chair ferme

B vorwiegend fest kochend
mainly firm cooking
assez chair ferme

C mehlig kochend / flowery cooking / farineuse